

D O R I A N A

Supplemento agli
ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE "G. DORIA"
GENOVA

Vol. VIII - N. 390

20.X.2014

HELIO PIEROTTI *

PERITELINI NUOVI O INTERESSANTI DELLA FAUNA W-PALEARCTICA. XXVII. ANCORA UNA NUOVA SPECIE DI *PSEUDOMEIRA* DEL GRUPPO *SARDOA*

(COLEOPTERA, CURCULIONIDAE, ENTIMINAE)

Alcuni esemplari di *Pseudomeira*, raccolti a suo tempo da Cesare Bellò e da me all'Argentario, si sono rivelati appartenere ad una specie nuova, riconducibile anch'essa - come *Pseudomeira abbaszii* dell'isola di Pianosa, recentemente descritta con l'amico e collega Lorenzo Forbicioni (PIEROTTI & FORBICIONI 2014) - al gruppo *sardoa*, caratterizzato da una particolare conformazione dell'armatura genitale del sacco interno del pene (PIEROTTI 2013). La sua descrizione costituisce l'oggetto della presente nota.

Le collezioni nelle quali sono conservati gli esemplari studiati sono indicate con le seguenti sigle rispettive: BEL = coll. Cesare Bellò, Castelfranco Veneto (Treviso); PIE = coll. Helio Pierotti, Treviso.

Pseudomeira annaedicata n. sp.

Holotypus ♂: Toscana, Argentario (GR), P.to Ercole, 20.4.92, leg. Pierotti (PIE). Paratypi: Toscana, Porto Ercole (GR), 17.9.92, leg. Pierotti (PIE 2 es.); Toscana, Argentario, GR, c/o p.ta Avoltore, 17.IX.92, leg. Bellò (BEL 4 es.); I. Toscana, GR, Argentario,

* Strada di Selvana 1, I-31100 Treviso; e-mail: peritelus@yahoo.it

p.ta Avoltore, 165 m, N 42°22'226" E 11°10'912", 18.VI.2011, leg. Bellò & Chemello (BEL 6 es., PIE 1 es.).

Diagnosi. Una specie di *Pseudomeira* di piccola statura (3,2-3,9 mm), appartenente al gruppo *sardoa*, con funicolo antennale robusto e setole elitrali reclinate agli omeri, sollevate sulla declività posteriore; si distingue da *parvula* (Seidlitz, 1865), della Liguria e della Toscana, per il funicolo antennale più robusto e le elitre più allungate, a lati meno arrotondati, talora subrettilinei, oltre che per il profilo della porzione apicale del pene e per la forma dell'armatura genitale.

Descrizione. Forma alquanto breve, robusta. Vestitura dorsale costituita da squame non o appena embricate, rameiche e terree, che formano due bande longitudinali ai lati del disco del pronoto ed una macchia periscutellare più scure, e da setole discretamente robuste, reclinate agli omeri, sollevate sulla declività posteriore.

Rostro largo, fortemente trasverso; pterigi non o appena salienti; epistoma poco incavato; clipeo longitudinalmente un po' infossato nel mezzo; fronte non molto più larga del clipeo, un po' infossata al centro, ai lati non molto più alta del margine oculare. Occhi un po' appiattiti, non o appena salienti. Antenne robuste con i primi due articoli del funicolo muniti di setole alquanto robuste, folte, il secondo articolo circa due volte più lungo che largo e gli articoli apicali trasversi; clava guttiforme, col primo articolo largamente svasato.


Pronoto fortemente trasverso, subarrotondato ai lati, solitamente più stretto alla base che al margine anteriore, con punteggiatura robusta.

Elitre ovoidali allungate, a lati debolmente arrotondati, talora subrettilinei, con la massima larghezza agli omeri o appena dietro questi, strie di punti ravvicinati non molto evidenti ed interstrie subpiane.

Zampe robuste, protibie sul lato esterno diritte, brevemente smussate all'apice.

Pene in visione dorsale a profilo largamente scutiforme nella regione apicale (fig. 1); sacco interno munito, oltre che di armatura genitale a margine anteriore completo e lamina dorsale glabra (fig. 2), anche di tre modeste armature supplementari (fig. 3).

Spermateca a cornu molto sviluppato e ramus poco evidente (fig. 4).



Figg. 1-4 - *Pseudomeira annaedicata* n. sp.: 1. porzione apicale del pene in visione dorsale; 2. armatura genitale del sacco interno del pene; 3. armature supplementari del sacco interno del pene; 4. spermateca.

Derivatio nominis. Dedicata a mia moglie, compagna preziosa anche nelle escursioni entomologiche.

Ecologia e distribuzione. La nuova specie, raccolta su *Erica* sp. e al vaglio di lettiera di *Pistacia lentiscus* L. e *Olea europaea* var. *sylvestris* Brot., è conosciuta attualmente solo del promontorio dell'Argentario.

BIBLIOGRAFIA

- PIEROTTI H., 2013 - Contributi al riordinamento sistematico dei Peritelini w-paleartici (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). VIII. Sintesi delle conoscenze al 31 dicembre 2010 - *Rev. suisse Zool.*, Genève, 120 (1): 29-81.
- PIEROTTI H. & FORBICIONI L., 2014 - Peritelini nuovi o interessanti della fauna w-paleartica. XXVI. Una nuova *Pseudomeira* del gruppo *sardoa* (Coleoptera Curculionidae Entiminae) - *Boll. Soc. ent. ital.*, Genova, 146 (in stampa).

RIASSUNTO

Viene descritta una nuova specie del genere *Pseudomeira* del gruppo *sardoa*: *annaedicata* del Promontorio dell'Argentario (Toscana); disegni di parti tassonomicamente significative completano il lavoro.

ABSTRACT

New or interesting Peritelini of the Western Palaearctic fauna. XXVII. Another new species of *Pseudomeira* of the *sardoa*-group (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae).

A new species of the genus *Pseudomeira*, *P. annaedicata*, from the Argentario's promontory (Tuscany, Italy), is described; illustrations of taxonomically relevant features are included.